

IMPORTANT MEDICAL INFO



THIS PATIENT HAS DIABETES MELLITUS AND IS AT RISK OF COMA

In case of somnolence, seizures or coma check blood glucose levels.

If blood glucose is low administer 50 ml of a 40% glucose solution as iv bolus in unconscious patients. If blood glucose is high (>250 mg/dL, >13.9 mmol/L) replace with isotonic crystalloid fluid (1 L in the first hour) \pm potassium and continuous infusion of 4-8 IU/h short-acting insulin and adopt according to glucose and electrolyte concentrations and hydration status.

Name

Date of birth



European Society
of **Endocrinology**

Важлива медична інформація



У ЦЬОГО ПАЦІЄНТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТА ІСНУЄ РИЗИК КОМИ

У разі сонливості, судом або коми необхідно перевірити рівень глюкози у крові.

Якщо рівень глюкози в крові низький, непритомним пацієнтам вводиться 50 мл 40% розчину глюкози шляхом внутрішньовенної болюсної ін'єкції.

Якщо рівень глюкози в крові високий (> 250 мг/дл, > 13,9 ммоль/л), вводиться ізотонічний кристалоїдний розчин (1 л протягом першої години) ± калій і безперервна інфузія інсуліну короткої дії у дозі 4–8 МО/год з корекцією з урахуванням концентрації глюкози та електролітів, а також статусу гідратації.

П. І. Б.

Дата народження