

IMPORTANT MEDICAL INFO



THIS PATIENT LACKS PARATHYROID HORMONE AND IS AT RISK OF HYPOCALCEMIC AND HYPERCALCEMIC CRISES.

In case of serious illness, nausea, vomiting and/or cramps, check serum calcium and kidney function.

If hypocalcemia and tetany, administer i.v. 2.5-5 mmol calcium chloride or gluconate (~100-200 mg elemental calcium) in 100 mL saline or glucose solution over 10 min. Repeat if needed.

If hypercalcemia > 3.5 mmol/L (14.0 mg/dL), administer saline intravenously and admit the patient immediately to hospital.

Name

Date of birth



European Society
of Endocrinology

Важлива медична інформація



У цього пацієнта недостатність паратиреоїдного гормону та існує ризик розвитку гіпокальціємічних і гіперкальціємічних кризів.

У разі серйозного захворювання, нудоти, блювання та/або спазмів перевірте сироватковий рівень кальцію та функцію нирок.

У разі гіпокальціємії та тетанії внутрішньовенно введіть 2,5–5 ммоль кальцію хлориду або глюконату (~100–200 мг елементарного кальцію) у 100 мл фізіологічного розчину або розчину глюкози протягом 10 хвилин. За необхідності повторіть.

У разі гіперкальціємії $> 3,5$ ммоль/л (14,0 мг/дл) введіть фізіологічний розчин внутрішньовенно та екстрено доставте пацієнта в лікарню для госпіталізації.

П. І. Б.

Дата народження