

IMPORTANT MEDICAL INFO



THIS PATIENT HAS DIABETES INSIPIDUS AND NEEDS DAILY REPLACEMENT WITH DESMOPRESSIN

If the patient is conscious, she/he should take the usual daily desmopressin treatment and drink freely.

If the patient is not conscious, she/he should be hydrated with isotonic intravenous infusion and treated with desmopressin (i.v. or nasal) with close blood electrolyte monitoring.

Hypernatremia indicates lack of desmopressin, hyponatremia overtreatment.

Name

Date of birth



European Society
of **Endocrinology**

Կարևոր Բժշկական Տեղեկատվություն



ԱՅՍ ՊԱՑԻԵՆՏՆ ՈՒՆԻ ՈՉ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏ ԵՎ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԻ ԴԵՍՍՈՊՐԵՍԻՆՈՎ ԱՄԵՆՕՐՅԱ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ԲՈՒԺՈՒՄ

Եթե պացիենտը գիտակից է, նա պետք է ընդունի դեամոպրեսինի օրական դեղաչափը և չսահմանափակի հեղուկների ընդունումը:

Եթե պացիենտն անգիտակից է, պետք է կատարել ներերակային հիդրատացիա իզոտոնիկ լուծույթով և բուժում դեամոպրեսինով (ն/ե կամ նազալ)՝ էլեկտրոլիտային բալանսի խիստ հսկողությամբ:

Հիպերնատրեմիան ցույց է տալիս դեամոպրեսինի ոչ բավարար դեղաչափը, հիպոնատրեմիան՝ գերդոզավորումը:

ԱԱՀ

Ծանոթյան ամսաթիվ