

IMPORTANT MEDICAL INFO



THIS PATIENT HAS DIABETES INSIPIDUS AND NEEDS DAILY REPLACEMENT WITH DESMOPRESSIN

If the patient is conscious, she/he should take the usual daily desmopressin treatment and drink freely.

If the patient is not conscious, she/he should be hydrated with isotonic intravenous infusion and treated with desmopressin (i.v. or nasal) with close blood electrolyte monitoring.

Hypernatremia indicates lack of desmopressin, hyponatremia overtreatment.

Name

Date of birth



European Society
of **Endocrinology**

Важная информация медицинского характера



У ЭТОГО ПАЦИЕНТА НЕСАХАРНЫЙ ДИАБЕТ, И ЕМУ ТРЕБУЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ДЕСМОПРЕССИНОМ

В случае неотложной медицинской или хирургической ситуации:

Если пациент находится в сознании, ему/ей необходимо ежедневно принимать десмопрессин и иметь свободный доступ к питью.

Если пациент не в сознании, ему/ей следует провести гидратацию путем внутривенной инфузии изотонического раствора и лечение десмопрессинном (в/в или назально) с тщательным мониторингом уровня электролитов в крови.

Гипернатриемия указывает на недостаток десмопрессина, а гипонатриемия — на передозировку.

Ф. И. О.

Дата рождения